

Tabelle 13.2: Beurteilung der Entwicklungsstadien von Wiesenbeständen anhand phänologischer Merkmale der Leitpflanzen bei der ersten Nutzung oder nach Alter des Futters bei Wiederaufwüchsen (Folgenutzungen).

Entwicklungsstadium		1 sehr früh	2 früh	3 mittelfrüh	4 mittel	5 mittelspät	6 spät	7 sehr spät	
Nutzungsintensität		Intensiv			mittelintensiv		wenig intensiv		
erste Nutzung im Frühling	Leitpflanze	Knaulgras und engl. Raigras	Bestockung →Beginn Schossen	Schossen (Weidestadium)	Beginn Rispenschieben	volles Rispenschieben	Ende Rispenschieben	Blüte	Samenbildung
		Wiesenfuchschwanz	Schossen (Weidestadium)	Beginn Rispenschieben	volles bis Ende Rispenschieben	Ende Rispenschieben→ Beginn Blüte	Blüte →Samenbildung	Samenbildung	Samenbildung→Samenreife
		Timothe	Bestockung	Bestockung →Beginn Schossen	Schossen (Weidestadium)	Schossen→Beginn Rispenschieben	Beginn bis volles Rispenschieben	volles Rispenschieben	Ende Rispenschieben
		Rotklee	vegetatives Stadium	Blütenknospen sichtbar	Schossen der Blütenknospen	Beginn Blüte	Vollblüte	verblüht	Beginn Samenbildung
		Löwenzahn	Blütenknospen sichtbar	Beginn Blüte (einige offene Blumen)	Vollblüte bis verblüht	Samenstände (einige Samen verweht)	Samen verweht, Stengel verdorrend	-	
		scharfer Hahnenfuss	Blütenknospen sichtbar	Beginn Schossen der Blütenknospen	Beginn Blüte	Vollblüte	verblüht	Samenbildung →Samenreife	Samenreife
	Zeitperiode ¹	bis 600 m	Anfang April bis Mitte April	Mitte April bis Ende April	Ende April bis Anfang Mai	Anfang Mai bis Mitte Mai	Mitte Mai bis Ende Mai	Ende Mai bis Anfang Juni	Anfang Juni bis Ende Juni
		über 600 m	pro 100 Höhenmeter 3 bis 5 Tage später (Südexposition und Föhntäler: eher 3 Tage; Schattenhänge: eher 5 Tage)						
Alter des Futters in Wochen²									
Folgenutzungen	bis 600 m : Sommeraufwüchse andere Aufwüchse	3 3-4	4 5-7	5-6 8-9	7-8 10 und mehr	9-10 -	11 und mehr -	- -	
	über 600 m : alle Wiederaufwüchse	3-4	5-7	8-9	10 und mehr	-	-	-	

¹ gilt für Dauerwiesen (Kunstwiesen haben eine um rund eine Woche verzögerte phänologische Entwicklung);

² bei Wiesenbeständen mit hauptsächlich italienischem Raigras wird das Stadium der Folgeaufwüchse wie bei der ersten Nutzung (1. Aufwuchs) bestimmt und nicht nach Alter